

## Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás informovali o nové možnosti laboratorního monitorování antikoagulační terapie **edoxabanem** (přípravek **LIXIANA**) - číslo metody v **NIS 1283** vyjádřené pomocí kalibrované kvantitativní analýzy anti-FXa aktivity.

V případě požadavku na provedení tohoto vyšetření indikujte v NIS metodu **-Xa Lixiana** (ve sloupci Kontrola antikoagulace) a zasílejte jednu Sarstedt zkumavku s 3,2% citrátem sodným. V žádance vždy uvádějte typ antikoagulancia, dávkování, datum a čas posledního podání.

Edoxaban vykazuje rychlý nástup farmakodynamických účinků do 1 - 2 hodin po podání. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o nově zaváděný přípravek je v literatuře uváděn pouze údaj o maximální koncentraci edoxabanu při dávce 60 mg, která se pohybuje od 330 - 350 ug/l.

Edoxaban prodlužuje standardní koagulační testy - protrombinový čas, INR a aktivovaný parciální tromboplastinový čas. Zaznamenané změny těchto koagulačních testů při očekávané léčebné dávce jsou však malé, velmi variabilní a nelze je použít ke sledování antikoagulačního účinku edoxabanu. (Dostupné z: <http://www.ema.europa.eu>)

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.  
Kolektiv ÚLD.