

DOPORUČOVANÉ POUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ANTIKOAGULANCIÍ

léčivo/indikace	síla doporučení
ARGATROBAN	
HITT (normální renální funkce i renální insuficience)	2C
izolovaná HIT (normální renální funkce i renální insuficience)	2C
akutní nebo subakutní HIT u pacientů s RRT	2C
akutní nebo subakutní HIT, pokud je vyžadována PCI	2C
pacienti s HIT v anamnéze (+ negativní HIT protilátky) kteří vyžadují srdeční katetrizaci nebo PCI	2C
DANAPAROID	
HITT (normální renální funkce)	2C
izolovaná HIT (normální renální funkce)	2C
akutní nebo subakutní HIT u pacientů s RRT	2C
akutní nebo subakutní HIT u těhotných pacientek	2C
BIVALIRUDIN	
akutní nebo subakutní HIT, pokud je vyžadována urgentní KCH operace	2C
akutní nebo subakutní HIT, pokud je vyžadována PCI	2B
pacienti s HIT v anamnéze (+ pozitivní HIT protilátky) kteří vyžadují KCH operaci	2C
pacienti s HIT v anamnéze (+ negativní HIT protilátky) kteří vyžadují srdeční katetrizaci nebo PCI	2B
FONDAPARINUX	
akutní nebo subakutní HIT u těhotných pacientek, POKUD není dostupný danaparoid	2C
pacienti s HIT v anamnéze + akutní trombózou nesouvisející s HIT a normálními renálními funkcemi (terapeutická dávka)	2C
POZNÁMKY HITT – HIT komplikovaná trombózou izolovaná HIT – HIT bez trombózy akutní HIT – trombocytopenie + pozitivní HIT protilátky subakutní HIT – destičky normalizovány + pozitivní HIT protilátky pacienti s HIT v anamnéze - HIT před > 3 měsíci	
zdroj: Linkins LA, Dans AL, Moores LK, et al. Treatment and prevention of heparin-induced thrombocytopenia: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012;141:e495S-530S	