

Informovaný souhlas pacientky s výkonem

Intravezikální chemoterapie po endoresekcii tumoru močového měchýře

Vážená paní,

vzhledem k tomu, že se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném postupu navrženém u Vaší osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech podrobně informována.

Na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem indikováno aplikování chemoterapie do močového měchýře pro neinvazivní karcinom močového měchýře.

Co je to neinvazivní karcinom močového měchýře:

Neinvazivní karcinom močového měchýře je maligní nádorové onemocnění, které postihuje epitel (výstelku) močového měchýře a nezasahuje do svalových vrstev měchýře. Typickým znakem tohoto onemocnění je tendence k recidivám, tedy opakovaným výskytům.

Jaký je důvod tohoto výkonu:

Pokud je u Vás diagnostikován neinvazivní karcinom močového měchýře, metodou první volby je operační řešení – endoskopické odstranění nádoru, které jste již podstoupili. Z dlouhodobého hlediska se však tato léčba nejeví jako dostatečná. U některých pacientů se může onemocnění znovu objevit s odstupem času, někdy i ve formě, která zasahuje do svalové vrstvy močového měchýře. Proto je optimální operační léčbu doplnit intravezikální chemoterapií.

Co je intravezikální chemoterapie:

Intravezikální chemoterapie je metodou léčby u karcinomu močového měchýře, při které se aplikují cytostatika (léky, které ničí nádorové buňky) přímo do močového měchýře. Variantou této léčby je intravezikální termochemoterapie (HIVEC), která spočívá v aplikaci roztoku cytostatika uvedeného výše, ohřátého na teplotu 43 stupňů Celsia. Zvýšená teplota usnadňuje průnik účinné látky do stěny močového měchýře a tím zvyšuje účinnost terapie. Užívá se jen u určené skupiny pacientů.

Jaký je postup při provádění výkonu:

Zavedeným močovým katétrem se po operaci do močového měchýře aplikuje jednorázově roztok cytostatika v objemu přibližně 50ml. Během toho zůstáváte na lůžku přibližně 60 minut. Po výplachu je účinná látka z močového měchýře vypuštěna katétrem. Katétr ponecháváme zavedený až do „vyčechení“ moči, většinou je odstraněn 1 až 2 dny po operaci.

Jaké jsou možné komplikace a rizika:

Během či po aplikaci intravezikální chemoterapie se mohou objevit celkové i lokální nežádoucí účinky. Mezi nejčastěji se vyskytující patří nucení na močení, bolesti v podbřišku, zvýšená teplota nebo přítomnost krve v moči. Tyto nežádoucí reakce po výkonu je vhodné zmírnit zvýšeným příjmem tekutin, případně užitím antipyretik či analgetik. Výjimečně se může vyskytnout alergická reakce na podávaný lék.

Jak často se léčba provádí:

Intravezikální chemoterapii se doporučuje zahájit bezprostředně po endoskopickém operačním odstranění nádoru. Frekvence aplikace je buď týdenní či měsíční, s různým odstupem mezi jednotlivými cykly. Celková doba léčby je maximálně jeden rok. Dle mezinárodních doporučení ale schéma aplikací není jednoznačně určeno.

Identifikační údaje pacientky:

Příjmení:		Jméno:		Titul:		RČ:	
-----------	--	--------	--	--------	--	-----	--

Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka:

Příjmení:		Jméno:		Datum narození:	
-----------	--	--------	--	-----------------	--

Plánovaný výkon:

Intravezikální chemoterapie po endoresekcii tumoru močového měchýře
--

Vysvětlující pohovor provedl:

Identifikace a podpis lékaře

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měla jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržela jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměla. S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informovala ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb a nezatajila jsem žádné okolnosti svého zdravotního stavu, které jsou překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací.

Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny.

V Ostravě dne: _____

 podpis pacientky, zákonného zástupce, opatrovníka