



### ENDOSONOGRRAFIE

- Od půlnoci nejíst a nekouřit. Přijem čirých tekutin do 500ml.
- V případě punkce je třeba koagulační vyšetření.
- Zajištění periferního žilního katétru pro podání premedikace.
- Přijít s doprovodem nebo doprovod na zavlání. Po premedikaci sledování cca 2 hodiny.
- Po celý den po podání premedikace nevykonávat činnosti s potřebou soustředění.
- Vyšetření se může provádět ambulantně, ale pokud se provádí punkce, pak za hospitalizace.




## INTERNÍ KLINIKA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

**PŘÍPRAVA PACIENTA  
K VYŠETŘENÍM A ZÁKROKŮM  
ZAŽÍVACÍHO TRAKTU  
A CÍLOVÝCH ORGÁNŮ**

### KONTAKTY

Interní klinika – Endoskopické centrum  
Fakultní nemocnice Ostrava  
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

tel.: +420 597 374191  
Ordinační doba 7.00-15:00



Vážené kolegyně a kolegové, vážení klienti,

Cílem nás všech je spokojenost našich klientů, pro kterou však je jednou z nezbytných podmínek realizace velmi kvalitního diagnostického procesu založeného na správné přípravě nemocného a vedoucího ke správné léčbě.

Smyslem předložené edukační příručky je uvedení základních podmínek optimální přípravy nemocných před plánovanými invazivními a neinvazivními výkony prováděnými lékaři Gastroenterologického centra Interní kliniky FN Ostrava. Obsah příručky je i k dispozici na webu FNO (Interní klinika) - ke stažení - informovaně souhlasly.



## **PŘÍPRAVA PACIENTA K VYŠETŘENÍ**

### **ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie)**

- Vždy za hospitalizace klienta.
- Klient je lačný.
- Klient před výkonem může popíjet 200-300ml čirých tekutin
- Zajištění periferního žilního katétru.

Po vyšetření na oddělení aplikace Indometacinu čípku 100mg. Sledujeme po vyšetření bolesti břicha, charakter stolice, puls a krevní tlak. Důležité je, aby v případě jakýchkoliv potíží klient ihned informoval ošetřující personál.

- Večer se provedou laboratorní vyšetření: krevní obraz, amyláza, lipáza.

## **KOLONOSKOPIE**

### **(provádí se ambulantně nebo za hospitalizace)**

Příprava před koloskopií :

- Poslední lehčí jídlo v den před vyšetřením v poledne (např. vývar), pak již jen příjem tekutin.
- K přípravě se používají přípravky dle preference doporučujícího lékaře - Fortrans, Moviprep , Eziclen, Picoprep – dle návodu jednotlivých přípravků.
- Lépe je provádět přípravu rozděleně, to znamená část vypít večer před vyšetřením a část brzy ráno před vyšetřením.
- V každém případě je třeba ke každému přípravku vypít dostatek jakýchkoliv tekutin – 2-3 litry.
- Při nejasnostech se poraďte se svým lékařem nebo se sestrou na endoskopii – tel. 597 374 191.
- Kvalitní příprava je nutnou podmínkou kvalitního vyšetření.
- Nemocné s diabetes mellitus event. s onemocněním ledvin je lépe připravit za hospitalizace. Hospitalizace po výkonu je nutná v případech, že lékař provádí během vyšetření terapeutický zákrok – snesení většího polypu metodou endoskopické polypektomie - za účelem sledování po zákroku.
- Během vyšetření dle potřeby lze aplikovat utišující injekce, v tomto případě pak je vyšetřovaný po zákroku sledován asi 1 hod. na observačním pokoji, měl by mít doprovod , je li to možné, a nesmí řídit auto. Jinak po vyšetření je možné pít i jíst bez omezení.



## **GASTROSKOPIE**

- Provádí se ambulantně nebo za hospitalizace.
- Přijít na lačno.
- Od půlnoci nejíst, pít malé množství pouze čiré tekutiny do 300m, nekouřit.
- U terapeutického výkonu je nutné mít před vyšetřením výsledky hemokoagulace.
- Možnost znecitlivění hltanu lokálním anestetikem (30minut nejíst, nepít - riziko aspirace), podání zklidňující injekce (1-2 hodiny sledování na observačním pokoji, po celý den nevykonávat činnost, při níž je nutné se soustředit, např. řízení vozidla).

### **Jícnová manometrie**

- Klient musí být lačný minimálně 6 hodin.
- Aspoň 24hodin vysadit léky ovlivňující jícnovou motilitu (prokinetika, blokátory kalciových kanálů, nitráty, anticholinergika, kofein).
- Při vyšetření jícnové impedance s Ph metrií klient alespoň týden před vyšetřením vysadí léky ovlivňující kyselost žaludečních šťáv (inhibitory protonové pumpy, blokátory).

### **Režim po výkonu:**

- Doporučuje se asi 2 hodiny nejíst, nepít.