



- | | |
|------------------------------------|--|
| A Poliklinika | N Klinika nukleární medicíny |
| B Diagnostické centrum | O Klinika onkologická |
| D Klinika dětského lékařství | Klinika hematooonkologie |
| Oddělení dětské neurologie | P Ústav patologie |
| I Klinika infekčního lékařství | S Ústav soudního lékařství |
| Kožní oddělení | T Oddělení plicních nemocí a tuberkulózy |
| K Krevní centrum | Oddělení psychiatrické |
| L Lůžkový monoblok | Klinika hematooonkologie |
| M Gynekologicko-porodnická klinika | Y Psychiatrický stacionář |
| Oddělení neonatologie | |



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

tel.: 597 37 2492

www.fno.cz



**Klinika anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny**

**PERIFERNÍ NERVOVÁ
BLOKÁDA**

Periferní nervová blokáda je jednou z metod, jak pacientům zajistit úlevu od bolesti během operace a po operaci. Jedná se o injekci lokálního anestetika kolem nervu, který vede do oblasti operace. Tato injekce způsobí znecitlivění oblasti, ve které bude operace probíhat.

Periferní nervový blok vede k úlevě od bolesti na dobu 4-48 hodin, v závislosti na tom, jaké lokální anestetikum použijeme, a kde se periferní nervová blokáda provádí. Úleva od bolesti je zpravidla výrazně větší než při pouhém podávání léků proti bolesti.

Samotné provedení blokády není bolestivé, lze jej přirovnat k aplikaci znecitlivující injekce u stomatologa.



BEZPROSTŘEDNĚ PO PROVEDENÍ BLOKÁDY:

- můžete cítit mravenčení v příslušné oblasti, ta Vám zároveň může připadat těžká a "cizí"
- nástup účinku může trvat až 60 min, po této době bude oblast necitlivá
- někdy můžete vnímat dotyk, tlak a pohyb

V PRŮBĚHU ÚČINKU BLOKÁDY:

- pokud blokáda pokryla celou operovanou oblast, nebudete potřebovat žádné další léky od bolesti nebo se jejich dávky významně sníží
- příslušná oblast zůstává necitlivá a často s ní ani není možno aktivně pohybovat, není důvod k obavám
- na místě je zvýšená opatrnost, necitlivá končetina může být náchylnější k úrazům

BĚHEM ODEZNÍVÁNÍ ÚČINKU BLOKÁDY:

- nervový blok odeznívá nejčastěji po 16-24 hodinách, a průběh může být podobný jako při nastupování účinku, opět můžete cítit mravenčení
- pokud uvedené změny pociťujete, informujte zdravotní sestru a požádejte ji o léky od bolesti již preventivně, nečekejte na kompletní odeznění účinku bloku
- bolest po odeznění bloku se může a nemusí projevit, pokud však vznikne, neznamená to, že by blok selhal, jeho účinek pouze odezněl
- další léčba bolesti již probíhá zpravidla podáváním léků proti bolesti

ZAVEDENÍ KATETRU K PERIFERNÍMU NERVOU:

- pro rozsáhlejší či bolestivější operační výkony nebo pro účely rehabilitace lze namísto jednorázového podání anestetika zavést k nervu katetr, tedy hadičku, kterou může být anestetikum aplikováno opakovaně
- při odeznívání účinku bloku pak lze skrz katetr příslušnou oblast opět znecitlivit
- katetr pak zůstává zaveden zpravidla několik dní a je pravidelně kontrolován sesterským personálem APS týmu KARIM

V případě dalších dotazů se prosím neváhejte obrátit na svého ošetřujícího lékaře či anesteziologa.

