

A JAK POSTUPOVAT PO PROPUŠTĚNÍ DO DOMÁCÍ PÉČE?

Po operaci přívěsků či píštěle je nutné chránit ránu před vodou a nečistotami. Po odstranění je stehů je vhodné ranku masírovat, jednak tlakovými masážemi (20 x denně na 20 sekund tlačit na jizvu - dojde k jejímu dřívějšímu vyblednutí) a dále uvolnění kůže v okolí jizvy jejími drobnými posuny do okolí. Vhodné je použití krému při masážích.

SPEKTRUM NAŠÍ PÉČE

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ušní, nosní, krční) patří se svými 30 lůžky, 2 operačními sály, 3 ORL ambulance-mi, 2 foniatrckými ambulance-mi, 2 ambulance-mi logopedickými, návazností na anesteziologické pracoviště a další kliniky Fakultní nemocnice k největším pracovištím v Čechách a na Moravě v ORL.

Mezi stěžejní programy ORL kliniky patří

- chirurgie štítné žlázy
- chirurgie tumorů hlavy a krku
- chirurgie slzných cest
- chirurgie nosu a vedlejších nosních dutin
- chirurgie středního ucha (vč. operace třmínku)
- operace slinných žláz
- diagnostika a chirurgie poruch spánku
- diagnostika a léčba poruch sluchu (včetně kochleární implan-tace)

Autoři:

P. Matoušek, K. Zeleník, P. Komínek

ISBN 978-80-88159-09-4



Kontakt:

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
KLINIKA OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY A KRKU**

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

e-mail: orl@fno.cz

**lůžková část - tel.: 597 375 812
ORL ambulance - tel.: 597 373 275
Po-Pá 7.30-15.00**



**KLINIKA
OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY
A KRKU**

**PREAURIKULÁRNÍ
PÍŠTĚLE A PŘÍVĚSKY**



INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

velmi si vážíme volby našeho pracoviště pro vyšetření a eventuální operaci Vašeho dítěte. Následující řádky Vám poskytnou informace o léčbě preaurikulárních píštělí a přívěsků

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

CO JE PREURIKULÁRNÍ PŘÍVĚSEK?

Ušní přívěsky (apendices preauriculares) jsou malé kožní výrůstky (velikosti obvykle 3-10mm) umístěné před ušním boltcem. Jedná se o vrozenou vadu, zjištěnou obvykle ihned po porodu. Může se vyskytovat jednostranně nebo i oboustranně, samostatně nebo společně s dalšími vývojovými poruchami (např. preaurikulární píštěl).

JAKÁ JE LÉČBA PREURIKULÁRNÍCH PŘÍVĚSKŮ?

Preaurikulární přívěsky není nezbytně nutné léčit. Přívěsky jsou pouze kosmetickou vadou. Jejich odstranění je možné chirurgicky. Obvykle doporučujeme rodičům odstranění přívěsků v předškolním věku.

JAK PROBÍHÁ OPERAČNÍ ODSTRANĚNÍ?

Operace probíhá obvykle v celkové anestézii, za hospitalizace dítěte. Přívěsek je z vřetenovitého řezu odstraněn a kůže v okolí je plasticky upravena a sešita. Stehy jsou odstraněny obvykle 7. pooperační den.

CO JE PREURIKULÁRNÍ PÍŠTĚL?

Preaurikulární píštěl (fistula preauricularis) je kůží vystlaný kanálek umístěný těsně před ušním boltcem, který končí slepě jako drobný váček. Je obvykle několik milimetrů dlouhý, vyvinut na jedné či obou stranách. Zevně je patrný jako tečkovitá vkleslinka. Může být bez dalších příznaků, někdy se z ústí píštěle uvolňuje bělavá hmota, tzv. detritus, může ale dojít i k zánětlivým změnám.



PREURIKULÁRNÍ PŘÍVĚSEK



PREURIKULÁRNÍ PÍŠTĚL

JAK SE PROJEVUJÍ ZÁNĚTLIVÉ ZMĚNY V PÍŠTĚLI?

V píštěli může dojít k bakteriální infekci, která se projevuje otokem, zarudnutím ahnisavou sekrecí z píštěle a bolestivostí. Někdy dochází k ucpání kožního ústí a vývoji abscesu.

JAK SE LÉČÍ PREURIKULÁRNÍ ABSCESES?

V případě vývoje abscesu je nutné rozříznutí abscesu a evakuace hnisu, obvykle jsou podávány i antibiotika. V době akutních zánětlivých změn obvykle nelze píštěl chirurgicky odstranit, je nutné vyčkat na zhojení a odstranění s odstupem.

KDY JE VHDNÉ PÍŠTĚL OPEROVAT?

V případě přítomnosti píštělí bez příznaků obvykle doporučujeme odstranění v předškolním věku. Odstraněny by měly být píštěle, u kterých dochází k opakovaným zánětlivým změnám, k tvorbě abscesů.

JAKÁ JE LÉČBA PREURIKULÁRNÍ PÍŠTĚLE?

Léčba píštěle je chirurgická, pokud se vyskytuje oboustranně, operační výkon se provádí v jedné době. Operace se provádí v celkové anestézii, z člunkovitého řezu je píštěl vypreparována a vcelku odstraněna. Někdy je k upřesnění průběhu píštěle během operace používána speciální barvicí látka (toluidinová modř). Stehy se obvykle odstraní 7. pooperační den.



RANKA PO ODSTRANĚNÍ PREURIKULÁRNÍ PÍŠTĚLE