

Informace pro

Určeno pro: lékaře

Zavedení terapeutického monitorování hladin vybraných beta-laktámových antibiotik

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás informovali o zavedení terapeutického monitorování hladin vybraných beta-laktámových antibiotik: **meropenem, piperacilin/tazobactam, ceftazidim, cefotaxim a cefepim.**

Terapeutické rozmezí: hladina před aplikací > MIC, u závažných infekcí > 4-5x MIC (minimální inhibiční koncentrace vyvolávajícího, resp. předpokládaného patogenu dle EUCAST).

Pro stanovení používejte skleněnou nebo plastovou zkumavku bez úpravy (doporučená Sarstedt Monovette neutral s granulemi nebo bez granulí). Z důvodu nízké stability vzorků, provádějte odběr pokud možno těsně před aplikací RANNÍ/DOPOLEDNÍ dávky, a **to v úterý až pátek.**

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv ÚLD.



Nemocnice akreditovaná
Joint Commission International



Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní diagnostiky, OKF

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz

Zdravotnická laboratoř č M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

