

Žádanka na vyšetření hladin acykloviru

Nemocnice:		Oddělení:		Tel. č.:	
Lékař:		IČZ:	Odbornost:		
Kód diagnózy:		Pojišťovna:		Č. účtu:	
Jméno pacienta:				Rodné číslo:	
Hmotnost:	kg	Výška:	cm	kreatinin ^{*)} :	urea:
Dialýza:		<input type="checkbox"/> ne	<input type="checkbox"/> ano:	<input type="checkbox"/> akutní	<input type="checkbox"/> chronická

Datum odběru:	odběr před podáním v:	hod.
antivirotikum nasazeno dne:	čas podání v:	hod.
délka dialýzy (od - do):	hod.	odběr po podání v:
frekvence dialýzy:		hod.
Důvod vyšetření:	Známky toxicity:	
<input type="checkbox"/> periodická kontrola	<input type="checkbox"/> ne	
<input type="checkbox"/> renální insuficience	<input type="checkbox"/> ano, jaké:	
<input type="checkbox"/> susp. intoxikace		

Acyklovir:				
Dávka:	mg	Interval podávání:	hod	způsob podání: <input type="checkbox"/> infuze - délka <input type="checkbox"/> p.o. hod.

Další léky (přípravek, dávkování): _____

Poznámka: _____

Tučně zvýrazněné položky jsou nezbytné pro interpretaci výsledků. Hmotnost uvádějte alespoň orientační.
 Odběr provádějte 4. - 5. den po nasazení antivirotika. 1. vzorek odeberte těsně před podáním ranní dávky antivirotika;
 2. vzorek za 30 minut po dokapání infuze nebo 2 hodiny po perorální dávce, nejlépe z periferní žíly (z jiného místa, než bylo antivirotikum aplikováno).
 *)Sérový kreatinin odebírejte nejlépe v den odběru hladin antivirotika.